



## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

**W MIĘDZYRZECZU**

Adresaci wg. rozdzielnika

Nasz znak: PIW-03- koresp. PIW AI - 04/2020

Dot. sprawy nr: WIW.OZZ.913.1.16.15.2020

pismo z dnia: 20.10.2020r.

W związku z w/w pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze informuję o opublikowaniu przez Europejski Urząd d.s Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) alertu dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków – w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu ( link do strony GLW w tej sprawie: <https://www.efsa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks>).

Ogniska te wystąpiły na szlaku migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja wystąpieniu w niedługim czasie dalszych ognisk, w tym w Polsce- analogiczna sytuacja była w 2005r. i 2016r.

Mając na względzie powyższe informuję o realnym wysokim zagrożeniu wystąpienia ognisk grypy ptaków w powiecie i konieczności :

- wzmocnienia bioasekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego.
- natychmiastowego zgłaszania do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) :
  
- każdego podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.
- znalezienia padłych ptaków dzikich.
- znalezienia padłego drobiu.

Dla przypomnienia przekazuję materiały informacyjne odnośnie zagrożenia i zapobiegania HPAI:

1. Obowiązki posiadacza drobiu.
2. Informacja dla hodowców drobiu.
3. Uwaga !HPAI.

Telefony kontaktowe :

PIW Międzyrzecz w godzinach od 7,00-15,30:

95 741 22 38 ; 602 452 631

PLW w Międzyrzeczu całodobowo: 696 080 727

---

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Zakaszewskiego 2,66-300 Międzyrzecz

tel.: (95) 741-22-38, fax: (95) 741-22-38, e-mail: [miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl](mailto:miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl),





Urzędy Gmin i Urzędy Miejskie proszę o przekazanie w/w materiałów posiadaczom drobiu przyzagrodowego oraz rozpowszechnienie powyższego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Właściciele ferm drobiu, ZWD, firm transportujących drób, zakładów branży spożywczej proszę o przeszkolenie pracowników w zakresie w/w załączonych materiałów informacyjnych i umieszczenie ich w widocznym miejscu w części biurowej zakładu oraz w części socjalnej dla pracowników, w środkach transportu drobiu.

Urzędowych lekarzy weterynarii i lekarzy weterynarii wolnej praktyki proszę o zamieszczenie powyższego w widocznym miejscu w prowadzonym zakładzie leczniczym dla drobiu oraz rozpowszechnianie podczas wykonywania czynności zawodowych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Międzyrzeczu

*Tek. wet. Małgorzata Marysek*

Otrzymują:

1. Urzędy Gmin, Urzędy Miejskie – wszystkie.
2. Fermy drobiu- wszystkie.
3. Zakłady wylęgu drobiu- wszystkie .
4. Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu drobiu- wszystkie.
5. Zakłady branży spożywczej – wszystkie.
6. Urzędowi Lekarze Weterynarii – wszyscy.
7. Lekarze weterynarii wolnej praktyki- wszyscy.
8. BIP PIW Międzyrzecz
9. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Międzyrzecki .
2. KPP Międzyrzecz .
3. KPPSP w Międzyrzeczu
4. PPIS w Międzyrzeczu .
5. Nadleśnictwa : Babimost, Bolewice, Karwin, Międzychód, Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel.
6. Koła Łowieckie – wszystkie.
7. PZŁ Zarząd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
8. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.
9. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp.
10. GDDKIA w Zielonej Górze
11. ARiMR BP w Międzyrzeczu
12. ODR w Kalsku Filia w Międzyrzeczu



## Obowiązki posiadacza zwierząt:

Należy wyraźnie podkreślić, że nakazy i zakazy skierowane są do posiadaczy zwierząt. Oznacza to, że to adresat decyzji (strona postępowania) jest zobligowana do wykonania powyższych nakazów i zakazów, w tym i zakazu zabicia i utylizacji zwierząt, a niewykonanie decyzji wiązać się musi z zastosowaniem przymusu egzekucyjnego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Posiadacz zwierząt wykonując nakazy i zakazy musi pamiętać, że obowiązują go przepisy prawa dotyczące m.in. sposobu zabicia ptaków, utylizacji zwłok zwierzęcych, dezynfekcji i oczyszczania pomieszczeń.

### Zabicie ptaków:

Odnosnie zabicia ptaków zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 303, str. 1), dotyczące „zmniejszenia liczebności”.

Zmniejszanie liczebności następuje pod nadzorem urzędowym, którego zadaniem jest zapewnienie możliwie jak największego dobrostanu zabijanych zwierząt.

### Utylizacja:

Utylizacja zwłok, produktów pochodzenia zwierzęcego, powinna zostać przeprowadzona w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia. Z punktu widzenia powyższej regulacji zwłoki, produkty pochodzenia zwierzęcego i obornik, których zniszczenia nakazał powiatowy lekarz weterynarii jest surowcem kategorii 2.

### Czyszczenie i odkażanie

Warunki i sposób przeprowadzania czyszczenia i odkażania, w tym odkażania pomieszczeń, nawozów naturalnych i ściółki został szczegółowo opisany w załączniku IV do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zwalczania grypy ptaków. Z punktu widzenia niniejszego opracowania kluczowy element związany z odkażaniem i czyszczeniem wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia ww. czynności pod nadzorem urzędowym i zgodnie z wytycznymi urzędowego lekarza weterynarii.



# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).



**Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:**

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

## **Hodowco !!!**

**Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)**

### **Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu**

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek, silne łzawienie, obrzęk zatok podczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.





# UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTORYCH NALEŻY PRZESTRZEGAC W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Jeżeli utrzymujesz drób, musisz to zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii.



Nie karm i nie pój drobinu na zewnątrz budynków gospodarskich. Nie wykorzystuj do pojenia drobinu wody ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Nie wnoś na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków oraz tusz ptaków łownych

Osoby, które uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne nie mogą w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania obsługiwać drobinu.



Myj i odkażaj narzędzia przeznaczone do obsługi drobinu przed każdym ich użyciem.

Przed i po obsłudze drobinu umyj ręce wodą z mydłem. Do pracy z drobinem używaj oddzielnego ubrania oraz butów i pozostawiaj je w kurniku.

Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób w systemie bezwybiegowym.

Zabezpiecz drób oraz paszę i ściótkę przed kontaktem z dzikim i ptakami.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



**W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:**

- 1. Przechowywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

## **Hodowco !!!**

**Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu**

### **Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu**

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, nieborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

## Podstawowe wymogi bioasekuracji:

1. Specjalna odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do wykonywania prac (karmienie, pojenie, czyszczenie itp.) z drobiem;
2. Posiadanie na stanie mat dezynfekcyjnych, w takiej liczbie, która zapewnia zabezpieczenie wszystkich wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą;
3. Posiadanie na stanie takiej ilości środków dezynfekcyjnych, żeby wystarczyły one do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji;
4. Budynki, w których utrzymywany jest drób, powinny być:
  - zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż drób utrzymywany w gospodarstwie, w tym dzikich ptaków;
  - utrzymywane w czystości.
5. W gospodarstwie należy wydzielić miejsca do składowania:
  - środków dezynfekcyjnych (miejsce te musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych),
  - obornika,
  - produktów leczniczych weterynaryjnych.
6. Umieszczenie przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, tablic z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
7. **Zakaz:**
  - 1) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  - 2) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; zakaz ten nie dotyczy więc osób utrzymujących ptaki, które nie mieszczą się ww. definicji drobiu.
8. **Nakaz:**
  - 1) utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
  - 2) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne *ptaki*, z wyłączeniem *ptaków* utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  - 3) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  - 4) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami oraz karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  - 5) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  - 6) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
  - 7) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

- 8) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- 9) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- 10) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Zarówno przegląd stad drobiu, jak i prowadzenie dokumentacji musi być prowadzone codziennie, a więc na bieżąco musi być to udokumentowane.

### Objawy:

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

- znaczna liczba nagłych padnięć,
- depresja,
- gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj,
- miękkie skorupy jaj,
- objawy nerwowe,
- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek,
- silne łzawienie,
- obrzęk zatok podoczodołowych,
- kichanie,
- duszność,
- biegunka.

Wystąpienie któregoś z powyższych objawów powinno być zgłoszone do powiatowego inspektoratu weterynarii