

## Wytyczne

### Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu

**dla gospodarstw utrzymujących drób na potrzeby własne lub inne ptactwo, położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków .**

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów obowiązujących na tym obszarze oraz rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 6.12.2016r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów obowiązujących na tym obszarze-

-wprowadzono zakazy i nakazy w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków i rozprzestrzenienia się choroby wśród drobiu, a tym samym dla zapobieżenia poważnym stratom gospodarczym.

W poniższej tabeli wskazuję niektóre sposoby wykonania tych zakazów i nakazów, przy czym należy mieć też na uwadze zapewnienie dobrostanu drobiu, gołębi przetrzymywanych przez długi czas w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz zabezpieczenie przed wystąpieniem u tego ptactwa innych chorób.

| Lp. | Zagadnienie   |
|-----|---|
| 1.  | Przestrzeganie zakazu wywożenia i rozrzucania ściółki oraz naturalnego nawozu drobiowego :<br>a/ ściółka musi być zabezpieczona przed dostępem ptactwa dzikiego i ich odchodów<br>b/ miejsce składowania nawozu drobiowego – nie należy usuwać nawozu drobiowego z kurnika, tylko dościelać suchą ściółką.  |
| 2.  | Przestrzeganie zakazu przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli poza obszar zagrożony:<br>a/ nie wolno wywozić z gospodarstwa ani wwozić do gospodarstwa drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli bez pisemnej zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii.<br>b/ należy sporządzić i codziennie aktualizować spis drobiu i innego ptactwa, począwszy od dnia 04.12.2016r. do czasu uchylenia zarządzeń.<br>W w/w spisie należy codziennie wykazywać :<br>- liczbę utrzymywanego drobiu lub innego ptactwa wg. gatunków<br>- sztuki padłe, przy czym upadek należy telefonicznie zgłosić do lekarza weterynarii i dalsze postępowanie uzależnić od jego decyzji.<br>-sztuki poddane ubojowi na potrzeby własne |
| 3.  | Przestrzeganie zakazu sprzedaży jaj konsumpcyjnych:<br>a/ pozyskiwane surowe jaja kurze przeznaczać na potrzeby własne w gospodarstwie  |
| 4.  | Przestrzeganie zakazu sprzedaży mięsa drobiowego pozyskanego w gospodarstwie :<br>a/ w spisie drobiu zapisywać liczbę sztuk drobiu poddanego ubojowi na potrzeby własne<br>b/ nie wywozić surowego mięsa drobiowego z gospodarstwa  |
| 5.  | Nakaz przeprowadzania kontroli gospodarstw z drobiem lub innym ptactwem :<br>a/ kontrole połączone z oceną stanu zdrowia drobiu przeprowadzają urzędowi lekarze weterynarii w odstępach co 3 dni.<br>b/ właściciele drobiu i innego ptactwa muszą być obecni podczas tych kontroli lub zapewnić obecność innej wskazanej przez siebie osoby.<br>c/w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia tej kontroli z powodu nieobecności osób   |



|    |  |
|----|--|
|    | <p>zamieszkujących w posesji, z urzędu muszą być kierowane wnioski do Policji o zastosowanie postępowania mandatowego.</p> <p>d/ inspektorzy PIW Międzyrzecz przeprowadzają wyrwykowe kontrole przestrzegania zakazów i nakazów wskazanych w cytowanych rozporządzeniach Wojewody Lubuskiego.</p> <p>e/ stwierdzenie łamania przepisów tego rozporządzenia podczas kontroli urzędowych lekarzy weterynarii lub inspektorów PIW Międzyrzecz skutkuje kierowaniem z urzędu wniosków do policji o zastosowanie postępowania mandatowego.</p>  |
| 6. | <p>Wykonanie nakazu odosobnienia drobiu i innego ptactwa w poszczególnych kurnikach lub innych pomieszczeniach, w którym jest on przetrzymywany:</p> <p>a/ drób musi być utrzymywany pod zamknięciem w kurniku, przy czym ewentualne otwory muszą być zabezpieczone siatkami metalowymi przed dostępem ptactwa dzikiego .</p> <p>b/ w analogiczny sposób należy zabezpieczyć gołębie i inne ptactwo.</p> <p>b/ drób można utrzymywać w kurniku zabezpieczonym jak wyżej, ale z dostępem do wybiegu szczelnie zabezpieczonego od góry i z boków przed dostępem ptactwa dzikiego- przy użyciu szczelnych materiałów zabezpieczających przed dostępem ptactwa dzikiego i ich odchodów.</p> <p>c/ w przypadku wykonania w/w zabezpieczenia wybiegu, teren wybieg należy odkazić przed rozpoczęciem prac, a następnie po ich wykonaniu - wypuszczeniem drobiu .</p> <p>Pozostawienie drobiu pod zamknięciem <b>ma podstawowe znaczenie</b> dla uniknięcia zachorowania tego drobiu na wysoce zjadliwą grypę ptaków i występowania kolejnych ognisk tej choroby. W ten sposób ptactwo domowe jest pozbawione kontaktu z ptactwem dzikim, które ma prawo być nosicielem tego wirusa i może zanieczyścić wirusem grypy wybiegi, karmę, wodę, ściółkę dla drobiu, gołębi itp..</p> <p>Do czasu unieczynnienia wirusa potencjalnie występującego w środowisku, należy zabezpieczyć drób przed zachorowaniem, trzymając w izolacji od środowiska zewnętrznego np. w kurniku.</p>  |
| 7. | <p>Wykonanie nakazu wyłożenia mat dezynfekcyjnych: dla zabezpieczenia przed przeniesieniem wirusa za pośrednictwem kół pojazdów, obuwia należy wykonać maty odkażające :</p> <p>a/ przed wejściami i wyjściami z gospodarstwa/ posesji ,</p> <p>b/ przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób</p> <p>c/ przed wejściami do pomieszczeń, w których jest drób , gołębie i inne ptactwo</p> <p>d/ przed wejściami na zabezpieczone wybiegi dla drobiu</p> <p>Prawidłowe wykonanie maty dezynfekcyjnej:</p> <p>a/ w przypadku gruntu nieutwardzonego w miejscu wyłożenia maty można wykonać płaskie zagłębienie w tym gruncie, wyłożyć je odpowiedniej wielkości folią / brzegi folii muszą wystawać ponad obszar zagłębienia/, na folię położyć trociny, starą wykładzinę, starą kołdrę, poduszkę lub inny materiał absorbujący ; nasączyć matę środkiem odkażającym i stale utrzymywać ją w stanie wilgotnym.</p> <p>b/ zamiast wykonania zagłębienia ma w gruncie, można wykonać obramowanie z np. desek, metalu; następnie położyć folię / brzegi folii muszą wystawać ponad obramowanie /, na folię położyć trociny, starą wykładzinę, starą kołdrę, poduszkę lub inny materiał absorbujący ; nasączyć matę środkiem odkażającym i stale utrzymywać ją w stanie wilgotnym.</p> <p>c/ w wejściach do obiektów można wykorzystać do budowy mat odpowiednio duże płaskie waniarki itp.</p> <p>d/ we wjazdach do gospodarstwa szerokość maty musi być na szerokość wjazdu. Długość maty musi zapewnić, by na macie obróciło się koło największego pojazdu, który wjeżdża na teren gospodarstwa / własny lub firmy zewnętrznej/.</p> <p>e/ w przypadku ujemnych temperatur otoczenia maty należy posypywać solą; matę w wejściu do kurnika,, gołębnika - przed wejściem poleć świeżym roztworem środka odkażającego z ciepłą</p> |



|    |  |
|----|--|
|    | <p>wodą.</p> <p>Należy obowiązkowo korzystać z maty wchodząc do obiektów z ptactwem, wychodząc z nich, wjeżdżając i wyjeżdżając z gospodarstwa- w ten sposób wirus, który może być na butach, oponach samochodów zostanie zniszczony. Dzięki temu sami nie wniesiemy wirusa do utrzymywanego drobiu i nie przeniesiemy do innych gospodarstw.</p> <p>f/ w posesji należy posiadać zapas środków odkażających do sporządzania mat dezynfekcyjnych, dezynfekcji pomieszczeń / np. Virkon S/ , do odkażania rąk / np. DDR lub inne na bazie alkoholu/.</p> <p>W pierwszych dniach perlustracji gospodarstwom wydawano Virkon S w celu natychmiastowego wykonania mat. W kolejnym etapie należy zaopatrzyć się w środki odkażające w hurtowniach weterynaryjnych lub u lekarzy weterynarii.</p>  |
| 8. | <p>Zapewnienie dobrostanu przetrzymywanego drobiu oraz innego ptactwa i zabezpieczenie przed innymi chorobami:</p> <p>a/ proszę na bieżąco dościelać ściółkę, tak, żeby w kurniku, gołębniku było sucho. Ściółka chłonie odchody, odory, zapewnia suche podłoże. Drób utrzymywany na mokrym podłożu przy dłuższym takim utrzymywaniu może zachorować np. z powodu pałeczek E. coli, Salmonelli lub innych drobnoustrojów; dojdzie też do ran na spodzie stóp drobiu.</p> <p>b/ wielkość pomieszczenia musi być dostosowana do liczby i gatunku przetrzymywanego drobiu, w przeciwnym razie z powodu nadmiernego zagęszczenia drobiu również zaczną się zachorowania.</p> <p>c/ liczba i wielkość odpowiednio karmideł / poidel powinna zapewniać swobodny dostęp do karmy/ wody wszystkim przetrzymywanym ptakom.</p> <p>d/ sposób umieszczenia karmideł i poidel nie powinien powodować zanieczyszczania karmy lub wody odchodami ptactwa, ściółką /- powinny być ustawione na niewielkim podwyższeniu. Inaczej drób sam będzie zagrzebywał tam ściółkę.</p> <p>e/ powinno być zapewnione światła dziennego</p> <p>f/zachorowania lub upadki drobiu należy zgłaszać do lekarza weterynarii<br/>W przypadku zastosowania leczenia należy przechowywać druk „Ewidencja leczenia”, którą lekarz weterynarii ma obowiązek pozostawić w gospodarstwie.</p> <p>g/ przy obsłudze drobiu, gołębi i innego ptactwa należy zapewnić odzież i obuwie wykorzystywane wyłącznie do tych prac.<br/>Ma to na celu wyeliminowanie ryzyka przeniesienia wirusa za pośrednictwem odzieży.</p> |

Stosowanie się do tych zaleceń przyczyni się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i innego ptactwa utrzymywanego w Państwa gospodarstwach.

Zapobiegnie to także przeniesieniu choroby do innych stad drobiu.

Należy liczyć się z faktem, że te rygory będą musiały być utrzymywane przez dłuższy czas, ponieważ w okresie zimowym słońce słabo niszczy wirusa w środowisku.

Dlatego ważne jest, żeby wykonać zalecenia, samemu przeanalizować, jak jeszcze można poprawić warunki zabezpieczonego drobiu, uzbroić się w cierpliwość .

Lek.wet. Małgorzata Matysek

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu

Lek. wet. Małgorzata Matysek